



# સખત દમ (એસ્મા) / સિસોટીના અવાજવાળા અંગત દમની કાર્ય યોજના

Gujarati

બાળકો અને 1 વર્ષની ઉપરના યુવાનો માટે સારું નિયંત્રણ

જાળવી અને સિધ્ધ કરવા માટે સલાહ

December 2016  
Kent, Surrey & Sussex  
Version




દરેક વખતે જ્યારે તમે તમારી GP સર્જરિમાં (અથવા હોસ્પિટલ) ડોક્ટર અથવા નર્સને મળવા જાઓ ત્યારે આ પ્લાન તમારી સાથે રાખશો. આ પ્લાન શ્રસન ક્રિયામાં થતાં અવાજ અથવા દમવાળા (એસ્મા) દરદીઓ માટે છે – તમારા GP/ ડોક્ટર (અથવા નર્સ) તે ભરી અને તમારા દમનું (એસ્મા) નિયંત્રણ કરવા જુદી જુદી દવાઓનો ખૂલાસો કરશે. જ્યારે દમ અથવા વીઝીંગ- અવાજ વધારે પડતો ખરાબ થાય તે કેવી રીતે નિશ્ચિત કરી અને તે માટે શું કરી શકાય તે તમને બતાવશે. શરૂઆતમાં ઉપાયો કરવાથી ઘણું કરીને ગંભીર હુમલાઓ અટકાવી શકાય.

## કૃપા કરી મોટા અક્ષરોમાં નીચે વિગતો લખો (અને/અથવા લેબલ બીડો):


લેબલ બીડલ	GP/ એસ્મા નર્સ _____
દરદીનું નામ _____	અને / અથવા હોસ્પિટલ ડોક્ટર/ એસ્મા નર્સ _____
જન્મતારીખ _____	ફોર્મની પૂર્ણ તારીખ ____/____/____
GP સર્જરિ _____	પ્રકેશનલનું નામ _____
ટેલિફોન _____	પ્રકેશનલની સહી _____
	રિવ્યૂ માટે તારીખ ____/____/____

## સ્પેસર વિથ એસ્મા ઈનહેલરના ઉપયોગની સ્ટેન્ડર્ડ ટેકનીક (પ્રેશરવાળા મીટરની માત્રાવાળું સાધન):

મુખવટા સાથે યોગ્ય કદના સ્પેસરની પસંદગી કરો (અથવા માઉથપીસની જો બાળક સારી ટેકનીકનું >4 વર્ષનું હોય અને મહત્વપૂર્ણરીતે હાંફતું ન હોય):



- 1 ઈનહેલરને બરાબર હલાવી અને ઢાંકણ દૂર કરો.
  - 2 ઈનહેલરને સ્પેસરના છેડે આવેલ ખાલી જગ્યામાં ફિટ કરો.
  - 3 બાળકના ચહેરા ઉપર મુખવટો મૂકો અથવા તેઓના મોઢામાં માઉથપીસ મૂકી ખાતરી કરો કે સારું સીલ છે.
  - 4 ઈનહેલરને એકવખત દબાવી અને દરેક ડોઝ વચ્ચે બાળકને 5 ધીરા ટાઈડલ શ્વાસ લેવા દો.
  - 5 ઈનહેલરને કાઢી અને દરેક બે પકડ વચ્ચે હલાવો.
- અનુગામી ડોસ- માત્રા માટે કદમ – સ્ટેપ 2 – 6 નું પુનરાવર્તન કરો.



## તમારો દમ (એસ્મા) / વીઝ (અવાજ) કેવો છે? (ટ્રેફિક લાઈટ સલાહ)

	ચિહ્નો	તમારું કાર્ય- કાર્યવાહી:
હળવો	જો તમને/ તમારા બાળકને છે: • કફ અથવા વીઝ માટે આખો દિવસ 4 કલાકે રાહત માટે 2-6 પકડસના ઉપયોગની જરૂર હોય પણ ઝડપથી શ્વાસ લેતું ન હોય અને દરરોજની પવૃત્તિઓ કરી અને પૂરતા વાક્યોમાં બોલી શકતું હોય.	તમારા GP ની એપોઈન્ટમેન્ટ બીજા દિવસે જોવા માટે ફોન કરો. વિકલ્પમાં જો તમે GP નો સંપર્ક ન કરી શકો તો 24 કલાકની સલાહ માટે 111 ફોન કરો.
મધ્યમ	જો તમને/તમારા બાળકને: • વીઝીંગ- અવાજ કરી અને હાંફતું હોય અને હંમેશનું રાહત આપનારું 4 કલાક ચાલતું હોય • દિવસ સમયે અને રાતના સમયે કફ અથવા વીઝના ચિહ્નો હોય	રાહત આપનારા 4 કલાકના 2-10 પકડસ આપો. તરતજ તમારા GP નો સંપર્ક કરી તમારા બાળકને તેજ દિવસ માટે અને મોઢા મોઢ જોવા એપોઈન્ટમેન્ટ કરો. વિકલ્પમાં, જો તમે GP નો સંપર્ક ન કરી શકો તો 24 કલાકની સલાહ માટે 111 ફોન કરો.
તીવ્ર	જો તમે / તમારું બાળક ખૂબજ હાંફતા: • વાતચીત/ ખાવા અથવા પી શકતું ન હોય • દોડી અને રમી શકતું હોય • કફ / વીઝના અથવા હાંફવાના (બ્રેથલેસનેસ) ચિહ્નો કે જે વધારે ખરાબ થતા હોય • અથવા રાહત આપનારું 4 કલાક ચાલે છે અથવા નહિ	રાહત આપનારા 10 પકડસ આપી, અને એમ્બ્યુલન્સ આવે ત્યાં સુધી દર 10 મિનિટે તેનું પુનરાવર્તન કરો. જો તમારા ધરમાં મોઢાથી લેવાની Oral Prednisolone હોય તો શરૂ કરો. <b>તાત્કાલિક મદદ માટે 999 ફોન કરો - (અથવા મોબાઈલમાંથી 112)</b>
જીવનનું જોખમ	જો તમને/ તમારા બાળકને છે: • કફ / હાંફવાના (બ્રેથલેસનેસ) તીવ્ર (સિવિઅર) અને સતત ચિહ્નો હોય • મૂઝવણમાં અથવા ઘેનમાં • રાહત આપનારું (બ્લૂ) નો પ્રતિભાવ કે જવાબ આપતું ન હોય.	રાહત આપનારા 10 પકડસ આપી, અને એમ્બ્યુલન્સ આવે ત્યાં સુધી દર 10 મિનિટે તેનું પુનરાવર્તન કરો. જો તમારા ધરમાં મોઢાથી લેવાની Oral Prednisolone હોય તો શરૂ કરો. <b>તાત્કાલિક મદદ માટે 999 ફોન કરો - (અથવા મોબાઈલમાંથી 112)</b>



GP સર્જરિ  
(અહીંયા નંબરની નોંધ કરો)

**NHS 111**  
**Sયલ111**  
(અઠવાદિયાના 7 દિવસે  
24 કલાક મળે)

સ્કૂલ/ નર્સ  
હેલ્થવિઝિટર ટીમ  
(અહીંયા નંબરની નોંધ કરો)

ઓનલાઈન સલાહ માટે: **NHS Choices** [www.nhs.uk](http://www.nhs.uk)  
(અઠવાદિયાના 7 દિવસે 24 કલાક મળે છે)

ફેમિલી ઈન્ફર્મેશન સર્વિસ: બધજ વિસ્તારોમાં ઓનલાઈન સર્વિસ – સેવા હોય છે કે જેની રચના સ્થાનિક કાઉન્સિલોએ કરી ફેમિલિને ઉપયોગી માહિતી આપે છે.

જો તમને તરજૂમા અથવા ભાષાના સપોર્ટની જરૂર જણાય, તો કૃપા કરી તમે જે સ્ટાફના સભ્ય સાથે વાતચીત કરો છો તેઓને જણાવો.


ફ્રીડબેક આપવા અથવા વધારે માહિતી માટે કે જેમાં આ દસ્તાવેજની વધારે નકલો કેવી રીતે મેળવી શકાય તે માટે (કૃપા કરી રેફ: **AP1** કવોટ કરો) અમારી પાસે સાઉથ ઈસ્ટ ક્લિનિકલ નેટવર્ક વિસ્તાર માટે એક મેઈલ બોક્સ છે (Kent, Surrey and Sussex). કૃપા કરી ઈમેઈલ કરો: [CWSCCG.cypSECpathways@nhs.net](mailto:CWSCCG.cypSECpathways@nhs.net)

# સખત દમ (એસ્મા) / સિસોટીના અવાજવાળા અંગત દમની કાર્ય યોજના

બાળકો અને 1 વર્ષની ઉપરના યુવાનો માટે સારું નિયંત્રણ

જાળવી અને સિધ્ધ કરવા માટે સલાહ

December 2016  
Kent, Surrey & Sussex  
Version



દરેક  
સલામતી  
સહયોગ

આ એસ્મા (દમ) / વીઝની (અવાજ) અંગત કાર્ય યોજના છે માટે

ફક્ત પૂર્ણ કરવામાં આવેલ વિભાગો ઉપરના બાળક/ યુવાને લાગુ પડે છે.

તમારો એસ્મા નિયંત્રણ હેઠળ હોય જો :

- તમને રોગના કોઈ ચિહ્નો ન હોય – દિવસ અથવા રાતના (વીઝીંગ, કફીંગ, ધાસ લેવાનું ઓછું થાય,, છાતી (ચેસ્ટ) સજ્જડના સમાવેશ સાથે). રોગના લક્ષણો કે ચિહ્નો વગર તમે તમારી બધી સામાન્ય પ્રવૃત્તિઓ કરી શકો.
- તમને અથવા તમારા બાળકને કોઈ રાહત આપનાર ઈનહેલરની (Salbutamol) જરૂર નથી.

## સારવાર

રાહતવાળી સારવાર : \_\_\_\_\_ ઈનહેલરનો રંગ (કલર): \_\_\_\_\_  
ઈનહેલર સાધનનું નામ: \_\_\_\_\_ સ્પેસર: \_\_\_\_\_

તે શું કરે છે? આવી વિઝીંગ (અવાજ કરતી) ઘટનાઓ દરમિયાન, આ રાહત આપનારાઓ હવાનો માર્ગ ખુલ્લો અને આરામદાયક રાખવામાં મદદ કરે છે.

જરૂર જણાતા ઉપયોગ:- ચિહ્નો જણાતા દરેક 4 કલાકે લઈ અને પુરાવર્તન કરી શકાય. 4-6 કલાકોમાં 4-6 પફસ કરતાં વધારે ડોસ નહિ સિવાયકે તમારા બાળકને તીવ્ર દમ (એસ્મા) / વીઝની ઘટના થઈ હોય કે જ્યારે 10 પફસ આપી શકાય.

**જો સુધારો ન જણાય, અને 10 થી વધારે પફસ વધારવાની જરૂર જણાય, તો મેડિકલ (તબીબી) સલાહ મેળવો.**

ઠંડી શરૂ થતાં અથવા તમારો કફ વીઝ (અવાજ) અથવા હાંફવાનું શરૂ થાય તે પહેલાં આ ઈનહેલરનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરો.

સ્પેસર મારફતે ઉપયોગ કરો, સિવાયકે અન્યથા કહેવામાં આવ્યું હોય.

**જો કોઈ 1 મહિનામાં તમને 1 કરતાં વધારે ઈનહેલર સાધનની જરૂર જણાય, તો તમારા ડોક્ટર અથવા એસ્મા નર્સને મળો.**

વધારાની સલાહ: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

અટકાવનારી સારવાર : \_\_\_\_\_ શક્તિ: \_\_\_\_\_ ઈનહેલરનો રંગ (કલર): \_\_\_\_\_  
ઈનહેલર સાધનનું નામ: \_\_\_\_\_ સ્પેસર: \_\_\_\_\_

તે શું કરે છે? પ્રિવેન્ટર ઈનહેલર સ્ટેરોઈડ્સ હોવાથી કે જે એન્ટિ ઈન્ફલેમટરી છે તે તમારા કે બાળકના હવાના માર્ગમાં સોજો ઉતારી અને સોજો અને દાહને ઓછો કરવામાં મદદ કરે છે. આ કારણને લઈને તે નિયમિતરીતે લેવી જોઈએ, પછી ભલે કોઈ ચિહ્નો ન હોય.

\_\_\_\_\_ દિવસમાં બે વખત નિયમિતરીતે પફસ લેવા, ભલે પછી કોઈ ચિહ્નો કે લક્ષણો ન હોય.  
આ ઈનહેલરને સવારના અને સાંજના લેવું.

આ દવા સ્ટેરોઈડ હોવાથી, તમારા દાંત સાફ કરો અથવા પછી મોં ધોઈ નાખો.

તમારી પ્રિવેન્ટર સારવાર બંધ કરશો નહિ, પછી ભલે તમે સ્વસ્થ હો, – સિવાયકે ડોક્ટર અથવા નર્સ સલાહ આપી હોય.

હંમેશા સ્પેસર મારફતે ઉપયોગ કરશો, સિવાયકે અન્યથા કહેવામાં આવ્યું હોય.

હંમેશા ખાતરી કરી વધારાનું ઈનહેલર રાખો, અને જ્યારે તમે આનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરો, ત્યારે નવા માટેની વિનંતી કરશો.

વધારાની સલાહ: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

વધારાની દવા (મેડિકેશન્સ/ સારવાર:

નામ / માત્રા (ડોસ) / વારંવારતા:

નામ / માત્રા (ડોસ) / વારંવારતા:

મૌખિક સ્ટેરોઈડ્સ (પ્રેડિનિસોલન) –ક્યારે તેનો ઉપયોગ કરવો અને માત્રા:

અધિકતમ પ્રવાહ (6 વર્ષ ઉપરના બાળકો) – જો લક્ષણો કે ચિહ્નો વધારે ખરાબ થાય, તો, સૌથી શ્રેષ્ઠ 3 અધિકતમ પ્રવાહના વાંચનનું માપ સવારના અને સાંજના કોઈ પણ બલ્યુ ઈનહેલર આપતા પહેલાં (રાહતવાળી સારવાર) કરી શકાય.

નિત્ય શ્રેષ્ઠ અધિકતમ પ્રવાહ \_\_\_\_\_ l/min (100%)

પૂર્વનિર્ધારિત અધિકતમ પ્રવાહ \_\_\_\_\_ l/min

જો તમારો અધિકતમ પ્રવાહ ((80% ના શ્રેષ્ઠ કે પૂર્વનિર્ધારિત) નીચે \_\_\_\_\_ હોય તો તમારો એસ્મા અંકુશ બહાર છે.

વીઝ / એસ્મા (દમ) સાથે તમારી અથવા તમારા બાળકની સંભાળ રાખવા

- હંમેશા ખાતરી કરો કે તમારા બાળકને તેના રાહતવાળા (બલ્યુ) ઈનહેલર અને સ્પેસરની સુગમતા હોય છે.
- વધારાનું સ્પેસર રિલીવર ઈનહેલર રાખવાનું યાદ રાખો (સ્પેસર સાથે/ વગરનું) તમારા બાળક માટે સ્કૂલમાં અને તે રાખવામાં આવેલ તારીખનું હોય તેની ખાતરી કરો.
- ઘરથી દૂર જ્યારે હોય ત્યારે તમારા અથવા તમારા બાળક માટે ઈનહેલર લઈ જવાનું યાદ રાખો.
- તમારા બાળક માટે લખી આપેલ (પ્રિસ્ક્રાઈબ) સાચા ઈનહેલર સાધનનો ઉપયોગ હંમેશા કરો.
- ઈમજનિસમાં રાહત આપવામાં (રિલીવર) સ્પેસર કોઈ એક શ્રેષ્ઠ માર્ગ કે ઉપાય છે તે યાદ રાખશો.
- કોઈ પણ અનુવર્તી (ફોલો અપ) જાળવી રાખવાનું યાદ રાખશો.



મારી શરૂઆત છે:

કફ અને ડોલ્ડસ \_\_\_\_\_  
સિગરેટ સ્મોક \_\_\_\_\_  
કસરત \_\_\_\_\_  
ઠંડુ હવામાન \_\_\_\_\_  
પેટ ફર અથવા ફેધર્સ \_\_\_\_\_  
ધૂળ \_\_\_\_\_  
પોલન \_\_\_\_\_  
પલ્શન \_\_\_\_\_  
લાગણીઓ \_\_\_\_\_  
મોલ્ડ અને સ્પોર્સ \_\_\_\_\_  
બીજા \_\_\_\_\_