

તમારા બાળકની ઘરે કેરીંગ અને / અથવા હોસ્પિટલમાંથી ડિસચાર્જ – મુક્તિ થતાં

- નળના પાણીથી કોઈ પણ ઘા – જખમને સાફ કરો.
- જો કોઈ વિસ્તારોમાં સોજો અથવા લોહી નીકળતુ હોય તો **5-10** મિનિટો સુધી દાબો. જો લોહી નીકળવાનું ચાલુ રહે તો દાબવાનું ચાલુ રાખી મેડિકલ- તબીબી સલાહ મેળવો.
- જો પીડા (પેઇન) હોય તો, પારાસિટિમોલ અથવા આઈબ્રુપ્રોફેન આપો. સાચી માત્રા અને પ્રકાર (ફોર્મ) માટે હંમેશા ઉત્પાદકોની (મેન્યુફેક્ચર્સ) સૂચના અનુસરો.
- હવે પછીના **2-3** દિવસો સુધી તમારા બાળકનું ગાઢ નિરીક્ષણ કરી અને તપાસ કરો કે તેનું વર્તન સામાન્ય રહી અને સામાન્યરીતે તે તમને જવાબ આપે છે.
- તમારા બાળકને સૂવા દેવાની છૂટ આપવાનું ઓકે ગણાય, પણ તેનું નિયમિતરીતે નિરીક્ષણ કરી તપાસ કરો કે તે સ્પર્શનો પ્રતિભાવ હંમેશાની જેમ આપે છે અને તેનું ધ્યાસ લેવાનું અને પથારીમાં સ્થિતિ સામાન્ય છે.
- તમારા બાળકને ખૂબજ આરામ આપો, અને ખાતરી કરો કે તે કોઈ પણ શ્રમ આપનારી પ્રવૃત્તિઓને પછીના **2-3** દિવસો માટે ટાળે છે અથવા રોગના લક્ષણો સ્થિર થાય ત્યાં સુધી.
- મસ્તકમાં ઈજા થયાને અનુસરીને તમારું બાળક કોઈ પણ સંપર્કવાળી રમત (જેમકે ફૂટબોલ) ઓછામાં ઓછા **3** અઠવાડિયાઓ સુધી ડોક્ટર સાથે પ્રથમ વાતચીત કર્યા વગર રમે નહિ.
- તમે તમારા બાળકને શ્રેષ્ઠરીતે જાણતા હો. જો તમે તેના વિશે ચિંતિત બનો તો તમારે વધારે સલાહ મેળવવી જોઈએ.

હદઉપરાંત ચિંતા કરશો નહિ- મસ્તકમાં ઈજા થયા બાદ આવું અપેક્ષિત હોય છે અને તે બે અઠવાડિયાઓ સુધી રહી શકે:

- TV અથવા કમ્પ્યુટર ગેઈમ્સ જોતા ખાસ કરીને રહી રહીને માથાનો દુખાવો
- તેમના ખોરાકથી દૂર રહે અથવા (ઊલટી વગર- વોમિટીંગ) માંદા (સિક) લાગે
- થાક- કંટાળો અથવા સૂવા જવામાં મુશ્કેલી
- થોડા સમય માટે બિજવાય, ગુસ્સો અથવા અપૂરતુ (પુચર) કેન્દ્રિકરણ

જો આવા લક્ષણો લાંબા સમય સુધી ચાલે તો તમારે મેડિકલ-તબીબી સલાહ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો.

ઉપયોગી સરનામાઓ

ઈમર્જન્સિ ડિપાર્ટમેન્ટ સાથેની હોસ્પિટલ

Royal Alexandra Children's Hospital

Eastern Road, Brighton BN2 5BE

Princess Royal Hospital

Lewes Road, Haywards Heath RH16 4EX

Surrey and Sussex Healthcare NHS Trust East Surrey Hospital

Canada Ave, Redhill, Surrey RH1 5RH

Western Sussex Hospitals NHS Foundation Trust

including:

St Richards Hospital

Spitalfield Lane, Chichester PO19 6SE

Worthing Hospital

Lyndhurst Rd, Worthing BN11 2DH

માઈનર ઈજારિ યૂનિટસ (MIU) અથવા અરજન્ટ કેર સેન્ટરો

Bognor Regis War Memorial Hospital

- Minor Injuries Unit

Shripney Road, Bognor Regis, PO22 9PP

બુલ્લા સોમવાર થી શુક્રવાર, સવારના 9 થી સાંજના 5 (બેન્ક હોલિડે સિવાય)

Crawley Urgent Treatment Centre - Crawley Hospital

West Green Drive, Crawley RH11 7DH

બુલ્લા અઠવાડિયાના 7 દિવસો 24 કલાક

Horsham Minor Injuries Unit - Horsham Hospital

Hurst Rd, Horsham RH12 2DR

બુલ્લા સોમવાર થી શુક્રવાર, સવારના 9 થી સાંજના 5 (બેન્ક હોલિડે સિવાય)

Queen Victoria Hospital Minor Injuries Unit (MIU), East Grinstead

Holtye Road, East Grinstead RH19 3DZ

બુલ્લા અઠવાડિયાના 7 દિવસો, સવારના 8 થી રાતના 10

West Sussex - Family Information Service

ટેલિ: 01243 777807 www.westsussex.gov.uk/family

આ દસ્તાવેજની વધારે નકલો માટે, વધારે માહિતી અને ફ્રીડબેક કે પુનઃનિવેશન માટે કૃપા કરી અમને ઈમેઈલ કરો

Chichester/Worthing area: contactus.coastal@nhs.net

Crawley area: CCCG.contactus-crawleycccg@nhs.net

Horsham/Mid Sussex area:

HSCCG.contactus-horshamandmidsussexcccg@nhs.net



Gujarati



બાળકો અને યુવાનોમાં થતી મસ્તકને ઈજા

December 2016 Refreshed Version

માબાપો અને કેરર્સ માટે સલાહ

બાળક/ યુવાન વ્યક્તિનું નામ

સલાહ આપેલ

ઈજા- હાનિનું સ્થાન

ઈજાનો પ્રકાર

તારીખ

સમય

મસ્તકમાં ઈજા માબાપો અને કેરર્સ માટે સલાહ

જે બાળકના મસ્તકમાં ઠીમણું / ઈજા થઈ હોય તેની શ્રેષ્ઠ કેર કેવી રીતે લેવા માટે આ પત્રિકા સલાહ આપે છે.

ભાગ્યેજ માથામાં થયેલ ઘાને (વુન્ડ) સ્ટેચીસની (ટાંકાની) જરૂર પડે, અને ઘણું કરીને હેલ્થ પ્રફેશનલ્સ તેને ઝલૂ કે ચોટાડતા હોય છે. આ માઈનર ઈજાને યુનિટસમાં અથવા અર્જન્ટ ટ્રીટમેન્ટ સેન્ટરોમાં કરી શકાય અને અમુક GP પ્રેક્ટિસ માઈનર ઈજાને સર્વિસ આપે છે. સ્થાનિક સર્વિસની માહિતી પાછલા પાને મળશે

કૃપા કરી “કેરીંગ ફોર યોર ચાઈલ્ડ એટ હોમ” સલાહ વિભાગનો ઉપયોગ કરશો (પાછળના પાને) અને તમને મદદરૂપ બનવા નીચેની ટ્રેફિક લાઈટ સલાહ. મોટા ભાગના બાળકો, જો ખાસ કરીને તેઓ ચપળ અને તમારી સાથે પારસ્પરિક્રિયા (ઈન્ટરએક્ટિંગ) કરતા હોય, તો ગ્રીન માર્ગદર્શન મૂજબ તેઓનો ઘરે પ્રબંધ કરી શકાય. પછીના 2-3 દિવસો સુધી બાળક ઉપર નજર રાખવાનું મહત્વનું ગણી ખાતરી કરો કે તેઓ હંમેશા મૂજબ તમારો પ્રતિભાવ આપે છે.

ટ્રેફિક લાઈટ સલાહ:



લીલો: ઓછું જોખમ

જો તમારું બાળક:

- તરતજ રડી (મસ્તક- માથાની (હેડ) ઈજા બાદ) અને ટૂંક સમયમાં તેમની હંમેશની વર્તણૂકમાં (બિહેવ્યર) પાછું આવે
- તમારી સાથે પારસ્પરિક્રિયા કરે અને ચપળ છે.
- બેભાન / “માથામાં ફટકો મારીને બેભાન” નહિ
- નાના ઉઝરડાઓ (બ્લૂઝીંગ), સોજો અથવા તેમના માથામાં ઘા હોય

કાર્ય (એક્શન): જો ઉપરનું બધું સંતોષવામાં આવેલ હોય, તો પછી ઘરે પ્રબંધ કરો. પાછળના પાનાની સલાહ અનુસરો, અથવા જો તમે ચિંતિત બનો તો, જ્યારે તમારા GP ખુલ્લા હોય ત્યારે તેમનો સંપર્ક કરો અથવા તમારી GP સર્જરિ ખુલ્લી ન હોય ત્યારે 111 ને ફોન કરો.

પીળો: મધ્યમ જોખમ

જો તમારું બાળક:

- એક અથવા બે વખત ઊલટી કરી હોય
- સતત માથાનો દુખાવો હોય
- ખિજવાય જાય (ઈરિટેબલ) અથવા ખાસ કરીને 5 વર્ષની નીચેના બાળકોની વર્તણૂકમાં (બિહેવ્યર) ફેરફાર (ઓલટર) જણાય.
- ડ્રગ્સ (દવાઓ) અથવા એલ્કોહોલની અસર હેઠળ છે
- ઈરાદાપૂર્વક ઈજા કરવામાં આવેલ હોવાથી તબીબી- મેડિકલ કાળજીની જરૂર છે.

કાર્ય (એક્શન): તમારા બાળકને લઈ જાઓ સૌથી નજીકના

**હોસ્પિટલ ઈમર્જન્સિ
ડિપાર્ટમેન્ટમાં**

જો આમાંના કોઈ પણ લક્ષણો (ફીચર) દેખાય (પ્રિઝન્ટ) તો

લાલ: ઊંચું જોખમ

જો તમારું બાળક:

- જો તમારું બાળક 1 વર્ષની નીચે હોય અને ઉઝરડો, સોજો અથવા > 5 cm નો ઘા થયેલ હોય
- ઝડપી ગતિના ટ્રેફિક રોડના અક્ષમાતમાં સમાવિષ્ટ હોય અથવા 1 મીટર ઉપરની ઊંચાઈએથી પડી ગયું હોય અથવા ઝડપી ગતિની વસ્તુથી માર લાગ્યો હોય અથવા પાણીના ભૂસકાથી અક્ષમાત થયો હોય
- બેભાન/ “માથામાં ફટકો લાગીને બેભાન” કોઈ પણ સમયે થયેલ હોય
- ઊંઘમાં છે અને તમે તેમને જગાડી ન શકો
- તાણ અથવા ફિટ કે મૂર્છા આવી હોય
- ગરદનમાં પીડા હોય
- તમે જે કહેતા હોય તે માટે બોલવામાં અથવા સમજવામાં મુશ્કેલી હોય
- તેમના હાથ અને પગમાં નબળાઈ હોય અથવા તેમનું સમતોલપણ ગુમાવે છે
- અક્ષમાત પહેલાં અથવા તેની આસપાસ કોઈ બનાવો યાદ કરી ન શકે
- હાનિ થયાના સમયથી તેના નાક, કાન અથવા બન્નેમાંથી પારદર્શક અથવા લોહીવાળું પ્રવાહી ટપકતું હોય
- 3 અથવા વધારે જુદા ઊલટીના હુમલાઓ થયા હોય

કાર્ય (એક્શન) : ફોન 999

(અથવા મોબાઈલમાંથી 112)

જો આમાંના કોઈ પણ લક્ષણો જોવામાં આવે તો, એમ્બ્યુલન્સ માટે