

## ડાયરિઆ (અતિસાર) અને/અથવા ઊલટી માટે સલાહ પત્રિકા

(ગેસ્ટ્રોએન્ટરોલોજી) 5 વર્ષ કરતાં નાના બાળકો માટે  
માબાપો અને કેરર્સ માટે સલાહ- સૂચન

December 2016  
Kent, Surrey & Sussex  
Version

South East Clinical Networks  
Children and Young People

દરદી  
સલામતી  
સહયોગ

બાળકનું નામ..... ઉંમર..... તારીખ / સલાહ આપેલ સમય .....

વધારે સલાહ / અનુવર્તી (ફોલો અપ) .....

ધંધાધારીનું (પ્રકેશનલ) નામ..... ધંધાધારીની સહી

## તમારા બાળકને કેમ છે? (ટ્રેફિક લાઈટ એડવાઈસ)



લાલ

જો તમારા બાળકને છે/ રહેલ છે:

- જગાડવા/ જવાબ ન આપે તે માટે મુશ્કેલી
- ફીકક અને કઠંગુ (ફોલોપિ) હોય
- શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી હોય
- ડાયબીટીઝ હોય
- કાબરચીતરી ચામડી સાથે ઠંડા પગ અને હાથ
- > 18 કલાકો સુધી નેપ્ચિઝ ભેજવાળી નહિ અથવા પેશાબ કર્યો ન હોય

તમને તાકીદે મદદની જરૂર

કૃપા કરી ફોન કરો **999**  
અથવા સૌથી નજીકની  
હોસ્પિટલ ઈમર્જન્સિસ (A&E)  
ડિપાર્ટમેન્ટમાં જાઓ



પીળા

જો તમારું બાળક:

- નિર્જલિત હોય તેવું દેખાતું હોય: એટલેકે સુકું મોં, અંદર બેસી ગયેલ આંખો, આંખમાં આંસુ ન હોય; ખોપરી બેસી ગયેલ હોય (બાળકના મસ્તકમાં સુંવાળી જગ્યા); ઘેનમાં હોય અથવા હંમેશા કરતાં ઓછો પેશાબ કરતું હોય.
- વિષ્ટામાં લોહી હોય અથવા સતત પેટમાં દુખાવો
- સ્તનપાન અથવા પીવાનું બંધ કર્યું હોય અને/ અથવા પીણા રાખી શકતું નથી/ આ માંદગી દરમિયાન મોઢાથી પ્રવાહી લેવાનું સહન કરે
- ચીંદિયુ બને અથવા સુસ્તી રહે
- તેઓને શ્વાસોચ્છ્વાસ ઝડપી અથવા ઊંડા બને
- કાબરચીતરી ચામડી વગર ઢંડા હાથ અને પગ હોય
- ઊલટીમાં (વોમિટ) લોહી જણાય
- અને 3 મહિના કરતાં નાનું હોય

તમારે સંપર્ક કરવાની જરૂર છે

ડોક્ટર અથવા નર્સનો આજે  
કૃપા કરી તમારી **GP**  
સર્જરિ અથવા ફોન  
**NHS 111** - ડાયલ 111



લીલા

જો ઉપર જણાવેલ કોઈ લક્ષણો દેખાય નહિ, તો મોટા ભાગના અતિસાર અને/ અથવા ઊલટી કરનારા બાળકોનો સલામતરીતે ઘરે પ્રબંધ કરી શકાય.

(કૃપા કરી નોંધ લેશો કે 1 વર્ષની નીચેના બાળકો અથવા જન્મ વખતે ઓછા વજનવાળા બાળકો નિર્જલિત થવાનું વધારે વલણ ધરાવે છે. જો અન્યથા તમારું બાળક સ્વસ્થ દેખાતું હોય, પણ છતાં તમે ચિંતિત દેખાતા હો તો કૃપા કરી **GP** સર્જરિનો સંપર્ક કરો અથવા ફોન કરો: **NHS 111**).

સેલ્ફ (સ્વયં) કેર

પાછળના પાને આપેલ  
સલાહનો ઉપયોગ કરી તમે  
તમારા બાળકની સંભાળ ઘરે  
રાખી શકશો.

મોટા ભાગના અતિસાર (ડાયરિઆ) અને/ અથવા ઊલટી કરનારા બાળકો જલદીથી સારા થતા હોય છે, પણ અમુક બાળકોનું સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થઈ શકે. તમારે નિયમિતરીતે તમારા બાળકની તપાસ રાખી અને તમારા હેલ્થકેર પ્રકેશનલ દ્વારા આપવામાં આવેલ સલાહને અનુસરવી જોઈએ અને/અથવા આ પત્રિકાની યાદીમાં આપેલ .

## થોડાંક ઉપયોગી ફોન નંબરો (તમને કદાચ અહીંયા અમુક નંબરો ઉમેરવાની ઈચ્છા થઈ શકે)



GP સર્જરિ  
(અહીંયા નંબરની નોંધ કરો)

**NHS 111**  
**ડાયલ 111**

(અઠવાડિયાના 7 દિવસો  
24 કલાક મળી રહે)

સ્કૂલ/ નર્સ /  
હેલ્થવિઝિટર ટીમ  
(અહીંયા નંબર નોંધ કરો)

ઓનલાઈન એડવાઈસ માટે:: **NHS Choices** [www.nhs.uk](http://www.nhs.uk) (અઠવાડિયાના 7 દિવસો 24 કલાક મળે છે)

ફેમિલિ ઈન્ફર્મેશન સર્વિસ: બધાજ વિસ્તારોમાં ઓનલાઈન સર્વિસ - સેવા હોય છે કે જેની રચના સ્થાનિક કાઉન્સિલોએ કરી ફેમિલિ માટે ઉપયોગી માહિતી પૂરી પાડે છે.

જો તમને તરજમા અથવા ભાષાના સપોર્ટની જરૂર જણાય. તો કૃપા કરી તમે જે સ્ટાફના સભ્ય સાથે વાતચીત કરો છો તેઓને જણાવો.  
ફીડબેક આપવા અથવા વધારે માહિતી માટે કે જેમાં આ દસ્તાવેજની વધારે નકલો કેવી રીતે મેળવી શકાય તે માટે (ફૃપા કરી રેક: **DV1**) કવોટ કરો) અમારી પાસે સાઉથ ઈસ્ટ ક્લિનિકલ નેટવર્ક વિસ્તાર માટે એક મેઇલ બોક્સ છે (Kent, Surrey and Sussex). કૃપા કરી ઈમેઇલ કરો: [CWSCCG.cypSECpathways@nhs.net](mailto:CWSCCG.cypSECpathways@nhs.net)

## ગેસ્ટ્રોએન્ટરાઈટિસ વિષે

સખત અતિસાર (ડાયરિઆ) અને/અથવા ઊલટી નિર્જલીકરણ તરફ લઈ જઈ શકે કે જેથી સામાન્ય કાર્ય કરવા શરીરમાં પૂરતું પાણી અથવા યોગ્ય સમતુલાવાળું મીઠું ન હોય. જો આવું નિર્જલીકરણ સખત બને તો તે જોખમકારક બની શકે. આવા વધારે પડતા નિર્જલીકરણના ભયવાળા બાળકોની સમાવેશ થાય 1 વર્ષની નીચેના બાળકો (ખાસ કરીને 6 મહિનાની હેઠળના), અને જેઓનું વજન જન્મ વખતે ઓછું હોય, અને જેઓને માંદગી દરમિયાન સ્તનપાન કરવાનું અથવા પીવાનું બંધ કર્યું હોય અને અપૂરતા પોષણવાળા અથવા અસ્થિર વિકાસ કરનારા બાળકો.

## હું મારા બાળકની કેવી રીતે સંભાળ- કાળજી લઈ શકું?

- અતિસાર 5 – 7 દિવસો વચ્ચે ચાલી અને 2 અઠવાડિયામાં બંધ થાય છે. ઘણું કરીને ઊલટી 3 દિવસો કરતાં વધારે રહે નહિ. જો તમારું બાળક આ સમય કરતાં વધારે બીમાર રહેવાનું ચાલુ રહે તો સલાહ મેળવો.
- જો તમારું બાળક સ્તનપાન કરતું હોય તો આ ચાલુ રાખો, નહિતો જ્યાં સુધી તે ફરીથી જલયોજિત થાય ત્યાં સુધી તેને નકકર ખોરાક લેવો જોઈએ નહિ.
- તમારા બાળકને ઘણું પ્રવાહી પીવા પ્રોત્સાહીત કરો – ખૂબજ થોડું અને વારંવાર પાણી પૂરતું ન કહેવાય અને આદર્શરૂપે ઓરલ રિહાઈડ્રેશન સોલ્યુશન (ORS) શ્રેષ્ઠ રહેશે. ORS એટલેકે ડાયરલાઈટ જે બાળકો નિર્જલીકરણ બન્યા હોય તેઓની સારવાર માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. મોટી સ્પૂરમાર્કેટ અને ફાર્મસિમાંથી કાઉન્ટર ઉપર ORS ખરીદી શકાય, કે જે નિર્જલીકરણ (ડિહાઈડ્રેશન) બનવાનું અટકાવે છે.
- પાણીના બદલે ORS ના સેશમાં રહેલ પાત્રને પાતળા (ડાલ્ટર) સ્કવોશમાં (નહિ “સૂગર ફ્રી સ્કવોશ”) મિશ્ર કરવાથી કદાચ સ્વાદમાં સુધારો થાય.
- જો તમારું બાળક નકકર ખોરાક લેવામાં રસ ન બતાવે તો ચિંતિત થશો નહિ, પણ ભૂખ્યુ બનતા ખોરાક આપો. ફિઝી પીણાઓ (ફિન્ક્સ) અને / અથવા ફૂટ જયૂસ નહિ આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે, કારણકે તે અતિસાર (ડાયરિઆ) વધારે ખરાબ કરી શકે. તમારા બાળક/ બેબિને જે પુનઃપ્રાપ્તિ કરવામાં મદદરૂપ રહે તેનું પોષણ આપવાનું મહત્વનું ગણાય.
- જો તમારા બાળકને રોગના બીજા લક્ષણો હોય, જેમકે વધારે તાવ (હાઈ ટેમ્પરેચર), સજજડ ગરદન અથવા ફોલ્લીઓ તો કૃપા કરી હેલ્થ પ્રફેશનલ પાસેથી સલાહ માટે પૂછો.
- તમારા બાળકને કદાચ પેટમાં ગોટલા કે આંકડી આવી શકે, જો સાદા પેઇનકીલર્સ મદદરૂપ ન જણાય તો કૃપા કરી વધારે સલાહ મેળવો.
- જો તમારું બાળક રૂટીન ઈમ્યુનાઈઝેશન કે રોગ- પ્રતિરક્ષણ લેવા માટે અપેક્ષિત હોય તો, કૃપા કરી GP અથવા પ્રેક્ટિસ નર્સ સાથે ચર્ચા કરો, કારણકે તેમાં વિલંબ કરવો ન જોઈએ.
- ગેસ્ટ્રોએન્ટરાઈટિસ ફેલાતા અટકાવવા માટે શ્રેષ્ઠ માર્ગ એ હાથ ધોવા કે સફાઈ છે.

## આફ્ટર કેર

એકવખત જ્યારે તમારું બાળક રીહાઈડ્રેટેડ થતા અને ઊલટી ન કરતું હોય:

- સ્તનપાન, બીજા દૂધના પોષણ અને પ્રવાહી લેવાનું ચાલુ રાખો – પૂરતી તાકાત – માત્રાનું દૂધ તરતજ આપો.
- બાળકના હંમેશના ખોરાકને ફરીથી આપવાનું શરૂ કરો.
- જ્યાં સુધી અતિસાર બંધ થાય ત્યાં સુધી ફૂટ જયૂસ અથવા ફિઝી પીણાઓ આપવાનું ટાળો.
- જો નિર્જલીકરણ (ડિહાઈડ્રેશન) ફરીથી બને તો, વળી પાછા ORS આપવાનું શરૂ કરો
- બાળકોને એન્ટિ- ડાયરિઅલ દવાઓ (કે જેને એન્ટિમોટિલિટિ (Antimotility) ડ્રગ્સ કહેવાય છે) તે આપવી નહિ\*



## ગેસ્ટ્રોએન્ટરાઈટિસના ફેલાવાને અટકાવવા (ડાયરિઆ અને/ અથવા ઊલટી):

તમારે અને/ અથવા તમારા બાળકે વહેતા ગરમ પાણીમાં સાબુ સાથે (જો શક્ય હોય તો પ્રવાહી) હાથ ધોઈ અને ત્યારબાદ સંભાળપૂર્વક સૂકા કરવા:

- ટોઇલિટ ગયા બાદ
- નેપ્ચિઝ બદલ્યા પછી
- ખોરાક સ્પર્શ કરતાં પહેલાં

તમારા બાળકે નહિ કરવું:

- તેનો/ તેણીનો ટુવાલ બીજા કોઈ સાથે શેર નહિ
- અતિસાર અને / અથવા ઊલટીની છેલ્લી ઘટનાઓ પછી 48 કલાકો સુધી સ્ફૂલે અથવા બીજી કોઈ ચાઈલ્ડકેર ફેસિલિટિમાં જવું નહિ.
- અતિસાર બંધ થઈ ગયા પછી 2 અઠવાડિયાઓ સુધી સ્વિમીંગ પૂલમાં જવું નહિ.